

Natężenie bólu	Ból o etiologii nieurazowej (4)		Ból o etiologii urazowej urazy, oparzenia
	Wiek		
	0-12 lat	> 12 lat	0-18 lat
ból łagodny	paracetamol 15 mg/kg m.c. i.v./i.o.	paracetamol 15 mg/kg m.c. i.v./i.o.	morfina 0,1 mg kg/m.c. i.v./i.o. lub fentanyl 1-3 µg/kg m.c. i.v./i.o. + postępowanie nefarmakologiczne (3)
	ibuprofen 10 mg/kg m.c. p.o. (1)	ibuprofen 10 mg/kg m.c. p.o.	
ból umiarkowany	paracetamol 15 mg/kg m.c. i.v./i.o.	paracetamol 15 mg/kg m.c. i.v./i.o.	
	ibuprofen 10 mg/kg m.c. p.o. (1) lub morfina 0,1 mg kg/m.c. i.v./i.o.	ibuprofen 10 mg/kg m.c. p.o. lub ketoprofen 50-100 mg i.v./i.o. (2, 5) lub morfina 0,1 mg kg/m.c. i.v./i.o.	
ból silny/ ekstremalny	morfina 0,1 mg kg/m.c. i.v./i.o.	morfina 0,1 mg kg/m.c. i.v./i.o. lub fentanyl 1-3 µg/kg m.c. i.v./i.o.	